

## Consejos prácticos para productores según especie

PRODUCTO	CONSEJO
<b>Granos Básicos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• En cultivos como el frijol y el maíz es recomendable usar siempre semilla certificada para evitar la transmisión de enfermedades.</li> <li>• Los especialistas también recomiendan adelantar la siembra del maíz en la Región Brunca.</li> <li>• El frijol debe sembrarse en terrenos con poca pendiente, que retengan la humedad y usen coberturas del suelo y abonos verdes. Esta última recomendación también es aplicable al maíz.</li> </ul>
<b>Café</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Es importante que aplique funguicidas con base de cobre y benlate entre los meses de septiembre y octubre para evitar la aparición de la roya. Es importante, además, que se use la fertilización foliar y que para combatir las malezas, se aplique un herbicida quemante para mantener el terreno limpio en la época de recolección, suspendiendo su uso en la época seca.</li> </ul>
<b>Plátano o banano criollo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• En el caso del plátano y banano criollo es necesario construir, recabar o dar mantenimiento a todos los drenajes internos de las fincas para evitar encharcamientos. Así se controla la Sigatoka Negra y otras plagas. En zonas de pendiente, donde se ubica generalmente el cultivo del banano criollo, se deben construir acequias de ladera y canales guardia. En las riveras de los ríos deben construirse barreras vivas y sembrarse especies como el sota caballo, bambú y cocos.</li> </ul>
<b>Tubérculos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Es conveniente construir o mejorar los drenajes internos de la finca con el fin de evitar el encharcamiento de agua, pues esto da pie a enfermedades como por ejemplo, el Mal Seco o Pudrición Radical que afecta al tiquisque. En terrenos que no permitan fácil filtración de agua, es recomendable buscar consejo sobre otras alternativas de cultivo para estos períodos.</li> </ul>
<b>Hortalizas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Para aquellos productores de hortalizas que acostumbran tapar con plástico sus eras, es recomendable que éste se coloque a 2 metros del suelo para no crear microclimas con temperaturas elevadas que maten la planta. La siembra de hortalizas debe hacerse por transplante y no en forma directa. Producir hortalizas bajo sistemas protegidos (invernaderos) con uso de riego por goteo.</li> </ul>
<b>Palmito</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• En este cultivo es necesario que los semilleros o almácigos estén ubicados cerca de una fuente de agua para asegurar su abastecimiento en época de escasez. En áreas con exceso de humedad en el suelo, es conveniente revisar periódicamente las plantas por si se detectan síntomas de amarillamiento y pudrición de la cepa.</li> </ul>
<b>Tabaco</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• En el tabaco, durante la época de semillero, se debe llevar un control de la disponibilidad en la región, de manera que aquellos agricultores con exceso de semillas puedan suplir a los que no tengan. La cosecha debe realizarse cuando aún haya agua disponible en el suelo.</li> </ul>

