Situación de pluviometría y embalses período 1993-1997

2.1.- ANALISIS PLUVIOMETRICO PERIODO 1993 - 1997

Del análisis de la tabla N°1 dónde se presentan las cantidades de agua caída a nivel estacional (mm), y el porcentaje de exceso o de déficit (del valor estacional acumulado) respecto del valor normal; se aprecia que durante 1993, desde Chillán al sur se registraron cantidades superiores a los valores normales concentrándose las lluvias principalmente durante la época de otoño. Hacia el norte, aunque los valores acumulados anuales se presentan ligeramente bajo los normales, también transitoriamente, durante la época de otoño, se manifestaron valores sobre las normales.

A continuación, comenzó a manifestarse un creciente déficit a nivel anual, que alcanzó su máxima expresión durante 1996 para la zona comprendida entre las Regiones V y X, y un marcado exceso en la Región XI según se observa en el gráfico N 3.

Las Regiones en que se manifestó mas intensamente el déficit de las precipitaciones fueron la III y IV. En el resto del país, los eventos de lluvia se manifestaron con bastante irregularidad desde el punto de vista espacio-temporal.

Esto se evidencia al comparar simultaneamente, las epocas de exceso y déficit en las distintas Regiones del país.

Esta situación que comprometía seriamente la actividad agrícola y ganadera al verse disminuida el agua para riego y de bebida para el ganado, así como la salud de la población rural al evidenciarse una carencia de ésta también para bebida humana, motivó al Ministerio de Agricultura a partir del mes de febrero de 1994, intervenir en principio en las regiones del norte del país bajo el expediente legal de "Emergencia Agrícola", para posteriormente extender su acción a otras regiones.